

Aus dem Pathologischen Institut d. Universität Erlangen.
Direktor: Professor Dr. E. Kirch.

Zur Genese
der sogenannten Apoplexia uteri.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde
einer Hohen Medizinischen Fakultät
der Friedrich-Alexanders-Universität zu Erlangen

vorgelegt von

Friedrich Ehrentreich

appr. Arzt

Tag der mündlichen Prüfung: 24. Dezember 1934.

Buchdruckerei Robert Windsheimer, Erlangen-Bruck.
1937

1937/238

Dekan: Herr Geheimrat Professor Dr. Jamin.
Referent: Herr Universitätsprofessor Dr. E. Kirch.



Bei älteren Frauen sind als ziemlich häufiger Sektionsbefund im Uteruscavum Blutungen in die Schleimhaut zu beobachten, und zwar erscheint das Endometrium dadurch diffus oder auch nur fleckförmig dunkelamtrot. Schon Cruveilhier (2) hat derartige Blutungen beobachtet und dafür den Namen „Apoplexia uteri“ geprägt, der dann später von Rokitansky (12) übernommen wurde und sich allgemein einbürgerte. Cruveilhier (2) unterscheidet dabei 2 Grade, einen leichteren, der sich auf die Schleimhaut und das angrenzende Gewebe beschränkt, und einen schwereren Grad, bei welchem die Blutung auch Teile der übrigen Uteruswand selbst betrifft. Die Cervix fand er an dem Prozeß ganz unbeteiligt, sie war hart und blaß, während das blutig infiltrierte Corpus erweicht erschien. Makroskopisch stellt der Fall, auf den sich Cruveilhier (2) bezieht, einen erweiterten Uterus dar, dessen Schleimhaut im Bereich des Corpus aufgequollen und durch haemorrhagische Infiltration dunkelrot gefärbt ist. Diese haemorrhagische Infiltration erstreckt sich auch noch auf das innere Drittel der Muskularis. Über die mikroskopischen Veränderungen hiebei waren keinerlei Angaben in der Arbeit von Kahlens (5) zu finden. Cruveilhier (2) stellt weiterhin fest, daß vielfach bei den Frauen, bei denen durch die Sektion eine Apoplexia uteri nachgewiesen wurde, in den letzten Tagen vor dem Tod gar keine Blutung aus den Genitalien stattgefunden hat. Niemals könne der Blutverlust so stark sein, daß daraus eine Gefahr für das Leben entstehe.

Eingehender hat sich 1898 von Kahlens (5) mit der Apoplexis uteri an Hand von 8 Fällen befaßt. Seine Befunde decken sich in der Hauptsache mit denen Cruveilhiers (2), lediglich bezüglich der Größenverhältnisse der an Apoplexie erkrankten Uteri bestehen Abweichungen, insofern als Cruveilhier (2) bei dem vorhin genannten schwereren Grad der Blutung immer eine beträchtliche Vergrößerung des Organs beobachtet hat. Von Kahlens (5) reiht den an sich an den Gefäßen sich ab-

spielenden Prozeß auf Grund seiner histologischen Untersuchungen unter den Begriff der Arteriosklerose ein. „Wucherungen der Intima, vielleicht auch Hypertrophien der Muskularis, Verkalkungen und in manchen Fällen anscheinend auch Neubildung von elastischen Fasern charakterisieren die Erkrankung der Wandarterien des Uterus, können sich aber in sehr verschiedener Weise miteinander kombinieren.“

Bezüglich der Aetiologie ist somit bei von Kahlen (5) für die vorliegende Arbeit von Wichtigkeit, daß er die Apoplexia uteri unter den Begriff der Arteriosklerose bzw. ihre Folgeerscheinungen einreicht. Eine Proportion zwischen dem Grade der Arteriosklerose in anderen Körpergebieten und zwischen der Erkrankung der Uterinarterien scheint nach seiner Ansicht nicht zu bestehen..

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang eine Arbeit E. Fraenkels (3) „Über den Uterus senilis, insbesondere das Verhalten in den Arterien in demselben.“ An Hand von röntgenologischen Untersuchungen bei Frauen jenseits des 60. Lebensjahres stellt er sehr häufig eine gleichmäßige Erkrankung beider Arteriae uterinae im Sinne einer Arteriosklerose mit Verkalkung fest. Bei histologischer Nachprüfung dieser Fälle findet Fraenkel (3) eine primäre Mediaerkrankung in den Gefäßen und zwar im Sinne einer verschieden ausgedehnten Medianekrose. Nahezu analog den Affektionen an den peripheren Arterien kommt es nach Ansicht Fraenkels (3) auch zu einer Verengung des Gefäßlumens mit nachfolgender Kalkinfiltration. Mit den beschriebenen Gefäßveränderungen soll nun auch die Atrophie des Uterus Hand in Hand gehen. Die Gefäßveränderungen sind also nach Fraenkel (3) „als Mittelpunkt der Rückbildungsvorgänge aufzufassen.“ Mit diesen bringt er auch die bei 25% aller senilen Uteri anzutreffenden Schleimhautblutungen in kausalem Zusammenhang. Fraenkel (3) und ebenso Kon und Karaki (7) glauben, daß die Arteriae uterinae bezüglich der Erkrankungen ihrer Gefäßwandungen einen gewissen Grad von Selbständigkeit gegenüber anderen Gefäßsystemen des Körpers besitzen.

Simmonds (13), der in seiner Arbeit „Über Blutungen des Endometriums bei Sklerose der Uterinarterien“ den Zusam-

menhang zwischen Arteriosklerose und Menorrhagien im Klimakterium erörtert, beschreibt bei seinen Fällen im Alter von 55 bis 80 Jahren einen im wesentlichen ähnlichen makroskopischen Befund wie die vorgenannten Autoren. Bei seinen mikroskopischen Untersuchungen ergab sich eine haemorrhagische Infiltration des Endometriums bei schwersten Veränderungen an den Arterien. Die Media zeigte vielfach hyaline Degenerationsherde und mächtige Kalkeinlagerungen. Auf Grund des mikroskopischen Verhaltens, des Mangels an haemoglobinogenen Pigmentablagerungen und anderer Residuen älterer Blutungen hält Simmonds (13) die Apoplexia uteri für eine agonale oder praeagonale Erscheinung, der eine klinische Bedeutung der Regel nach nicht gebührt. Als Hauptursache der Blutungen sieht Simmonds (13) sklerosierte Gefäße an und betont, daß oft der Uterus der einzige Sitz derartiger Gefäßerkrankungen ist.

Im Lehrbuch von Kaufmann (6) wird die Apoplexia uteri ebenfalls im Sinne der vorhergenannten Autoren beschrieben und auf Ernährungsstörungen — Sklerose und Verkalkung — der Uterinarterien bezogen. Nach Ansicht Kaufmanns sollen die Uterinarterien schon sehr früh, ja sogar zuerst von allen Körperarterien Sklerose zeigen können. Im Gegensatz zu anderen Autoren beschreibt Kaufmann (6) auch Fälle, bei denen lebensbedrohliche Blutungen infolge der Apoplexia uteri auftraten.

Hierher gehören anscheinend auch die 3 von Bukojemsky (1) beschriebenen Fälle von Frauen im Alter von 40, 52 und 40 Jahren, die wegen der starken Blutungen zur Exstirpation der Uteri führten. Doch deckt sich nur bei einem der Fälle der histologische Befund an den Gefäßen mit den vorher beschriebenen Untersuchungsergebnissen. Ein ähnlicher Fall scheint der von Solovji (14) beschriebene zu sein. Weiterhin gehören hieher 4 Fälle Reinickes (11), deren Zugehörigkeit zur Apoplexia uteri auf Grund der zu geringen histologischen Veränderungen an den Gefäßen jedoch von anderen Autoren stark bestritten wird, (von Kahlden [5] und Simmonds [13]). Die drei letztgenannten Autoren (Bukojemsky 1, Simmonds 13 und Reinicke 11) sehen die Ursache der Blutungen in lokalen primären Veränderungen der Uterusgefäße.

Diese Gefäßsklerose am Uterus bringt Robert Meyer (8) in

einer größeren Arbeit über „die Pathologische Anatomie der Gebärmutter“ aetiologisch in Zusammenhang mit Rheuma, Arthritis (Bukojemsky 1), Nieren, Gallensteinleiden, Purpura rheumatica, Lues, Tuberkulose und Malaria. Kon und Karaki (7), Pankow (9) und Hueck (4) haben die Gefäßsklerose als eine Folge der Schwangerschaften erkannt. Letzterer hat Uteri von 20—40 jährigen Nulliparen untersucht und dabei nichts nennenswertes gefunden. Aber an den Uteri der Frauen, die auch nur einmal geboren haben oder an Organen die in Schrumpfung befindlich sind hat Hueck (4) eine Veränderung im Sinne der hyalin elastoiden Degeneration der Gefäße festgestellt.

Eigene Untersuchungen, die ich auf Veranlassung von Herrn Professor Dr. E. Kirch am Sektionsmaterial des Erlanger Pathologischen Institutes über die Apoplexia uteri angestellt habe, galten nur vor allem einer Prüfung etwaiger Beziehungen der Apoplexia uteri zu den Kreislaufverhältnissen des Gesamtorganismus, und zwar insbesondere zu atherosklerotischen Veränderungen an den Arterien des Körperkreislaufs einerseits und zur essentiellen Hypertonie andererseits. Örtliche Untersuchungen in der Uteruswandung mußten naturgemäß hinzugenommen und mitberücksichtigt werden.

Diese Fragestellungen sind umso mehr berechtigt, als gerade in Bezug auf die essentielle Hypertonie in etwaigem Zusammenhang mit der Apoplexia uteri noch gar keine Literaturangaben vorzuliegen scheinen, wenigstens habe ich solche nicht ausfindig machen können. Nachdem aber die essentielle Hypertonie in der neueren Zeit als eine geradezu gesetzmäßige Vorbedingung für die Entstehung der Apoplexia sanguinea cerebri erkannt worden ist, liegt der Gedanke nahe, auch bei der Apoplexia uteri Prüfungen nach dieser Richtung hin auszuführen, wenn gleich naturgemäß die hier in Betracht kommenden Blutungen im Hirn einerseits und Uterusschleimhaut andererseits nicht ohne weiteres gleichgesetzt werden dürfen.

Bezüglich der Atherosklerose liegen zwar schon mehrere Angaben im Schrifttum dahingehend vor, daß ein Zusammenhang zwischen den arteriosklerotischen Veränderungen im Gebärmutterbereich bei Apoplexia uteri einerseits und in sonstigen

Gebieten des großen Kreislaufs andererseits als unwahrscheinlich bezeichnet wird (von Kahlden (5), Fraenkel (3), Simmonds (13), Kaufmann (6)). Dennoch dürfte eine Ueberprüfung dieser zum Teil schon alten Angaben an Hand neuerer systematischer Untersuchungen angebracht sein.

Es wurden von mir insgesamt 34 Fälle von makroskopisch sicherer Apoplexia uteri festgestellt. Davon konnte ich das bei insgesamt 14 Fällen noch vorhandene Material auch einer genauen mikroskopischen Untersuchung unterziehen. In klinischer Beziehung war es leider nur in wenigen Fällen möglich, den Blutdruck der letzten Lebenszeit aus den vorhandenen Krankengeschichten zu ermitteln. Pathologisch-anatomisch durfte aber aus den Sektionsbefunden einer evtl. vorhandenen linksseitigen Herzhypertrophie ohne sonstige Ursachen und einer Arteriosklerose der Nieren bzw. von arteriosklerotischen Schrumpfnieren auf eine essentielle Hypertonie geschlossen werden. Weiterhin wurde, wie aus den nachfolgenden Tabellen ersichtlich ist, besonderes Augenmerk auf die Arteriosklerose im Gesamtorganismus (Aortensklerose, Coronargefäßsklerose, Hirnbasisgefäßsklerose, Atherosklerose der Arterialis lienalis, arteriosklerotische Nierenschrumpfungsherde etc.) im Vergleich zum Alter gerichtet. Diese beiden Gesichtspunkte finden in den beiden nachstehenden Tabellen eine besondere Berücksichtigung.

Da aber nur bei einem Teil der Fälle die Uteri aufbewahrt wurden und mir zur histologischen Untersuchung zugänglich gewesen waren, erfolgte eine Unterteilung und zwar wurden in Tabelle I diejenigen 14 Fälle behandelt, bei denen das Material von mir histologisch verarbeitet worden war. Die Tabelle II enthält die restlichen 20 Fälle, bei denen lediglich an Hand des Sektionsprotokolles eine Apoplexia uteri nachzuweisen war.

Bevor ich aber des Näheren auf diese Tabelle eingehe, sei noch erwähnt, daß noch eine 2. Aufstellung angefertigt wurde, die sämtliche Fälle von starker Atherosklerose und essentieller Hypertonie bei Frauen jenseits des Klimakteriums umfaßt und zwar auf Grund der Sektionsprotokolle der letzten 2 ³/₄ Jahre, also der Jahrgänge 1932, 1933 und 1934 bis zum 1. Oktober.

Diese Zusammenstellung, die gewissermaßen eine Gegenprobe zu der vorher erwähnten darstellen soll, wird erst später erörtert.

Eine 3. Zusammenstellung umfaßt für die gleichen 2³/₄ Jahre die Fälle von Frauen des postklimakterischen Alters ohne essen- tielle Hypertonie und ohne stärkere Atherosklerose der ver- schiedenen Körperarterien. Auch für diese war dann die Anzahl der von einer Apoplexia uteri Betroffenen getrennt zu berech- nen und vergleichsweise zu verwerten.

Tabelle I.

Fälle von sicherer path.-anatom. eigens untersuchter
Apoplexia uteri.

Lfd. Nr.	Sekt.- Nr.	Alter Jahre	Hauptleiden und Todesursache.	Anhaltsp. f. eine essent. Hypertonie.		Arteriosk. i. Gesamtorg. i. Vergl. zum Alter.
				klin. R. R.	path.-anatom.	
1	30/32	83	Schenkelhals- fr., Alters- schwäche.		Geringe Hypertr. u. stärkere Dil. aller Herzabshn. Geringe Arterio- lo u. etwas stär- kere Arteriosk. der Nieren.	Aorta: deutliche Intima- einl. u. bef. i. asc. Teil Kalkherde u. atheroma- töse Geschwüre. Coro- nargef.: nur leichte Athe- rosklerose.
2	37/32	69	Myodegene- ratio cortis		Hypertrophie des li. Herzens. Ar- terio- u. arterio- iosklerot. Schrumpfnieren.	Aorta: z. T. starke athe- rosklerot. Veränderun- gen mit geschwürigen Zerfall. Coronargef.: nur geringe atherom. Einlagerungen.
3	87/32	78	Altersverblö- dg. Marasmus		Geringe Hypertr. u. Dilat. des li. Herzens. Arterio- u. arterioskler. Schrumpfnieren.	Starke Atheroskl. der Aorta, vorwieg. i. Bauch- teil. Die Coronarar- terien: sklerotisch ver- dickt, desgl. die Hirnba- sise Gefäße.
4	115/32	75	Myokardin- fuff. Broncho- pneumonie	125/75	Hypertrophie u. Dilat. des li. Her- zens. Arterio- u. Arteriosklero- se der Nieren.	Aorta: reichliche bis star- ke atherosklerot. Ein- lagerungen. Coronar- gef.: nur geringe Athe- rosklerose.
5	119/32	64	Senile Demenz, Marasmus	150/60	Hypertrophie u. Dilat. des li. Ven- trikels. Arterio- sklerotische Schrumpfnieren.	Atherosklerose der Aor- ta. Sklerose der Coro- nargefäße.

Tabelle I (Fortsetzung)

Lfd. Nr.	Sekt.-Nr.	Alter Jahre	Hauptleiden und Todesursache.	Anhaltsp. f. eine essent. Hypertonie.		Arterioskler. i. Gesamtorg. i. Vergl. zum Alter.
				klin. R. R.	path.-anatom.	
6	178/32	64	Cholera nostras	80/50	keine	Mäßige Atheromatose der Aorta. Desgl. der Coronargefäße.
7	267/32	67	Carcinom der Gallenwege u. des Magens		keine	Aorta: mäßig starke atheromatöse Einlagerungen. Hirnbasisgefäße intakt.
8	286/32	77	Gallenblasenempyem		Hypertr. u. Dilat. aller Herzabchn. geringen Grades. Arterio- u. Arteriolo-sklerose der Nieren.	Atherosklerose der Aorta. In der re. Coronararterie atheromatöse Flecken.
9	ausw. Sekt. 13. 10. 32.	84	Marasmus senilis. Oberarmfraktur		Geringe Hypertrophie u. Dilat. des li. Herzens. Keine ausgesprochene Arteriolo-sklerose der Nieren.	Hochgr. atherosklerot. Veränderungen der Aorta. Geringe Atherosklerose d. li. Kranzarterie. Arteriosklerosis cerebri.
10	32/33	89	Dementia senilis		Arteriosklerotische Nierenschrumpfungen.	Ausgedehnte atherosklerotische Veränderungen der Aorta. Coronar-sklerose. Sklerose der Hirnbasisgefäße.
11	141/33	70	Altersdemenz, Marasmus		keine	Starke Atherosklerose der Aorta, sowie der Coronargefäße.
12	249/33	73	Senile Demenz		Etwas Hypertr. u. Dilat. des ganzen li. Herzens.	Atherosklerose der Aorta mit Thromben. Mäßig starke Atherosklerose der Coronargefäße. Sklerose der Hirnbasisarterien.
13	326/33	81	Zuckerharnruhr, Altersschwäche. Diabetische Gangrän.		keine	Starke Atherosklerose der Aorta. Coronar-sklerose. Sklerose der Hirnbasisgefäße.
14	362/34	63	Myodegeneratio cordis, Hirnblutung, Herztod	früher 200 mm Hg	Keine Hypertrophie des linken Ventrikels (dabei Mitralstenose)	Vereinzelte Intimaflecken der Coronararterien. Aorta für das Alter zartwandig. Geringe Hirnbasisgefäß-sklerose.

Tabelle II.

Fälle von sicherer Apoplexia uteri ohne eigene path.-anatom. Untersuchungen derselben.

Lfd. Nr.	Sekt.-Nr.	Alter Jahre	Hauptleiden und Todesursache.	Anhaltsp. f. eine essent. Hypertonie.		Arterioskler. i. Gesamtorg. i. Vergl. zum Alter.
				klin. R. R.	path.-anatom.	
15	40/32	61	Metencephalitis		keine	Aorta: spärliche atheromatöse Veränd. Hirnarterien: reichl. Verdickungen ohne Kalk-einlagerungen, keine wesentliche Coronar-sklerose.
16	104/32	82	Postapoplektischer Zustand, Herzinsuffizienz	220/110	Athero- u. arteriosklerot. Schrumpfnieren.	Starke Atherosklerose der Aorta. Mäßig starke Coronar-sklerose der Hirnbasisgefäße.
17	111/32	66	Apoplexie Arteriosklerose	165/105	Geringe Hypertrophie u. Dilat. des li. Herzens. Atherosklerotische Schrumpfnieren.	Ausgedehnte Sklerose der Aorta u. der Coronargefäße. Basale Hirnarterien ziemlich stark sklerotisiert.
18	183/32	58	Magencarcinom, Zustand n. Gastroenterostomie		Hypertrophie u. Dilat. des li. Herzens	Mäßig starke Atherosklerose der Aorta.
19	223/32	81	Senile Demenz		Dilat. ohne Hypertrophie des li. Ventrikels. Geringe atherosklerotische Schrumpfnieren.	Atherosklerose der Aorta u. mäßig starke der Hirnbasisgefäße und der Coronargefäße.
20	270/32	74	Senium, Myodegeneratio cordis.	131/65	Hypertrophie u. Dilat. des li. Ventrikels, Arterio- u. Arteriolo-sklerose der Nieren.	Mittelstarke Atheromatose der Aorta. Etwas Coronar-sklerose.
21	273/32	51	Apoplexie, Bronchopneumonie	160/80	Hypertrophie des li. Ventrikels. Deutliche Arterio-sklerose.	Atherosklerose der Aorta, der Coronargefäße und gering der Hirnbasisgefäße.
22	61/33	66	Embolie		keine	Aorta u. Coronargefäße nur gering atherosklerotisch verändert. Desgl. die Hirnbasisgefäße.

Tabelle II (Fortsetzung)

Lfd. Nr.	Sekt. Nr.	Alter Jahre	Hauptleiden und Todesursache.	Anhaltsp. f. eine essent. Hypertonie.		Arterioskler. i. Gesamtorg. i. Vergl. zum Alter
				klin. R. R.	path.-anatom.	
23	116/33	69	Myodegeneratio cordis.	95/55	keine	Aorta enorm verkalkte ather. Geschwüre. Die Coronargefäße atherosklerotisch verändert.
24	158/33	65	Postapoplektisches Irresein		Dilatation und Hypertrophie des li. Ventrikels und Vorhofs. Arteriolo-sklerotische Schrumpfnieren.	Starke Atherosklerose der Aorta. Coronarsklerose. Sklerose der Hirnbasisgefäße.
25	163/33	62	Depressionszustand, Herzverfagen			Mäßig starke Atheromatose der Aorta. Geringe Coronarsklerose. Geringe Arteriolo-sklerose der Nieren.
26	169/33	78	Magencarcinom, Myodegeneratio cordis	95/45		Mäßige Atherosklerose der Coronargefäße.
27	173/33	86	Senile Demenz		Dilatation u. Hypertrophie des li. Ventrikels. Arterio u. arteriolo-sklerotische Schrumpfnieren.	Starke Atherosklerose der Aorta und der Coronargefäße und der Hirnbasisgefäße.
28	223/33	63	Ileus			Mäßig starke Atherosklerose der Aorta, sowie der Coronargefäße.
29	242/33	61	Magen-carcinom			Aorta: wenig atheromatöse Veränderungen im Bauchbereich.
30	280/33	80	Arteriosklerotische Demenz		Hypertrophie des li. Ventrikels, arteriolo-sklerotische Schrumpfnieren.	Atherosklerose der Aorta. Geringe Atherosklerose der Coronargefäße und starke der Hirnbasisgefäße.
31	322/33	77	Senium, Bronchopneumonie	135/60	Dilatation und Hypertrophie des li. Ventrikels. Arterio- und arteriolo-sklerotische Schrumpfnieren.	Mäßig starke Atherosklerose der Aorta. Geringe Coronarsklerose.

Tabelle II (Fortsetzung)

Lfd. Nr.	Sekt.-Nr.	Alter Jahre	Hauptleiden und Todesursache.	Anhaltsp. f. eine essent. Hypertonie.		Arterioskler. i. Gesamtorg. i. Vergl. zum Alter.
				klin. R. R.	path.-anatom.	
32	72/34	68	Erysipel, Pneumonie	110/65		Reichliche Atheromatose der Aorta und der Coronargefäße.
33	106/34	52	Exfoliative Erythrodermie (Dermatitis)			Keine.
34	180/34	65	Urosepsis			Atherosklerose der Aorta. Reichlich sklerotische Einlagerungen an den Coronargefäßen.

Aus der Tabelle I und II geht hervor, daß es sich bei den Fällen von Apoplexia uteri durchweg um Frauen jenseits des Klimakteriums und zwar vom 51. bis hinauf zum 89. Lebensjahre handelt. Davon entfallen 3 Fälle auf das 51. bis 60. Lebensjahr, 15 Fälle auf das 61. bis 70. Lebensjahr, 9 Fälle auf das 71. bis 80. Lebensjahr und endlich 7 Fälle auf das 81. bis 90. Lebensjahr. Die größte Häufung findet sich also im 7. Dezennium.

Bei Prüfung des Zusammenhangs zwischen Apoplexia uteri und essentieller Hypertonie an Hand der Tabellen ergibt sich nun, daß pathologisch-anatomisch in 15 von den 34 Fällen (Fall Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 27, 30, 31) Zeichen einer essentiellen Hypertonie vorhanden sind, charakterisiert durch linksseitige Herzhypertrophie und Arteriosklerose der Nieren bzw. arteriosklerotische Schrumpfnieren. Unter diesen Fällen war nur 3 mal (Fall Nr. 12, 16, 21) eine klinisch festgestellte Blutdruckerhöhung nachzuweisen. Hierzu kommt noch der oben nicht mitgenannte Fall 14 bei dem eine Hypertonie (von 200 mm Hg.) nur vorübergehender Art vorlag, ohne anatomisch nachweisbare Folgen. Der niedrige oder normale Wert bei den übrigen Fällen, soweit der Blutdruck überhaupt bekannt geworden war spricht aber nicht unbedingt gegen die essentielle Hypertonie, sondern kann auch lediglich als Insuffizienzercheinung des linken Herzens aufgefaßt werden. Es steht also fest,

daß 44,1 % der hier bearbeiteten Fälle von Apoplexie uteri eine essentielle Hypertonie aufweisen, bei Hinzunahme des Falles Nr. 14 mit nur vorübergehender Hypertonie insgesamt 47,0 %, also die knappe Hälfte.

Von den in Tabelle I und II zusammengestellten 34 Fällen von sicherer Apoplexia uteri zeigen nur 17 Fälle (Fall Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 24, 27, 30, 32) für ihr Lebensalter starke atherosklerotische Veränderungen der Arterien im Gesamtorganismus. Dabei lassen einige dieser Fälle starke Sklerose in der Aorta, an den Coronar- und Hirnbasisgefäßen, zum Teil auch in den Nieren in Form von arterio- (und eventuell auch arteriolo) sklerotischen Schrumpfungsherden erkennen. Andere Fälle weisen nur in einem dieser Gefäßgebiete solche starke Veränderungen auf. Bemerkenswert ist, daß unter diesen 17 Fällen mit atherosklerotischen Gefäßveränderungen 11 Fälle (Fall Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 17, 24, 27, 30) gleichzeitig auch eine essentielle Hypertonie aufweisen. Demnach sind bei meinen Untersuchungen über 34 Fälle von Apoplexie uteri 50,0 % mit starker Arteriosklerose behaftet, also genau die Hälfte, wovon aber wieder etwa 32,3 % gleichzeitig eine essentielle Hypertonie aufweisen.

Schließlich verbleiben bei der Betrachtung der Tabelle I und II noch 13 Fälle (Fall Nr. 6, 7, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 28, 29, 33, 34) bei denen weder Veränderungen im Sinne einer essentiellen Hypertonie noch solche einer starken Atherosklerose aufzufinden waren, wenn auch bei den meisten von ihnen ein mäßiger Grad von Atherosklerose im Gefäßsystem vorhanden war. Aber es entspricht der hierbei erhobene Befund von atherosklerotischen Veränderungen dem jeweiligen Alter und ist gewissermaßen als physiologisch zu bezeichnen. Diese letzten Fälle kamen durch die allerverschiedensten Krankheiten ad exitum, so daß auch hieraus keinerlei Schlüsse gezogen werden können. Die Zahl dieser Fälle die eine Apoplexia uteri ohne erhebliche Veränderungen im sonstigen Gefäßsystem aufweisen, beträgt demnach 38,2 %. Das bedeutet: nur bei einem guten Drittel unserer Fälle von Apoplexia uteri war eine essentielle Hypertonie und eine starke Atherosklerose im Gesamt-

organismus zu vermissen, bei fast zwei Drittel wenigstens eines von beiden vorhanden.

Von 34 Fällen von Apoplexia uteri haben demnach:

eine essentielle Hypertonie	15 Fälle = 44,1 %
bzw.	16 " = 47,0 %
eine starke Atherosklerose	17 " = 50,0 %
eines von beiden od. beides	21 " = 61,8 %
keines von beiden	13 " = 38,2 %
beides zusammen	11 " = 32,3 %
nur eines davon	10 " = 29,4 %
und zwar nur essentielle Hypertonie	4 " = 11,7 %
nur starke Atherosklerose	6 " = 17,6 %

Sprach schon dieser auffällige Befund bei statistischer Auswertung unserer Fälle von sogenannter Apoplexia uteri dafür, daß den genannten Kreislauferkrankungen einer essentiellen Hypertonie einerseits und einer schweren Körperarteriosklerose andererseits eine gewisse Bedeutung der hier in Frage stehenden Uterusblutungen zukommt, so wurde dieser Eindruck noch verstärkt, als wir unsere Fälle auf ihre zahlenmäßigen Beziehungen zum Gesamtmaterial hin prüften.

Es wurden zunächst aus dem gesamten Sektionsmaterial des Instituts 2³/₄ Jahre (1. Jan. 1932 — 1. Oktober 1934) alle jene Fälle zusammengestellt, bei denen es sich um Frauen des postklimakterischen Lebensalters handelte, wobei die Grenze mit 50 Jahren angenommen wurde. Es ergab sich eine Gesamtzahl von 170 Fällen und unter diesen befanden sich auch die besprochenen 34 Fälle von Apoplexia uteri, das bedeutet genau 20 % für das Vorkommen der Apoplexia uteri unter der Gesamtheit der Frauen im fortgeschrittenen Lebensalter. Diese Zahl ist etwas niedriger als die von E. Fraenkel(3) angegebene Zahl von 25 % aller senilen Uteri. Sonstige Vergleichszahlen habe ich in der Literatur nicht finden können.

Unter der eben genannten Gesamtzahl von 170 Frauen des postklimakterischen Lebensalters konnten nun an Hand der Sektionsprotokolle 65 ausfindig gemacht werden, bei denen eine essentielle Hypertonie oder aber eine schwere im Körper ausgebreitete Arteriosklerose oder beides gleichzeitig vorlag. Zu diesen

gehören auch die schon erwähnten 21 Fälle von Apoplexia uteri das heißt 32,3 %.

Demgegenüber konnten unter den restlichen 105 Fällen, die weder eine essentielle Hypertonie noch eine starke Atherosklerose an den Körperarterien aufwies, und auf diese Gruppe entfallen 13 Fälle der Apoplexia uteri das heißt nur 12,4 % auf die gesamte Gruppe bezogen.

Somit ergibt sich der Schluß: daß unter den gesamten Frauen jenseits des 50. Lebensjahres der Prozentsatz der Apoplexia uteri von 20 auf 32,3 % ansteigt, wenn eine essentielle Hypertonie oder eine ausgedehnte Arteriosklerose vorliegt und auf 12,4 % abfällt, sofern diese Kreislaufveränderungen fehlen. Bei Vorliegen der genannten allgemeinen Kreislaufveränderungen ist also die sogenannte Apoplexia uteri 3 mal so häufig als ohne sie. Ob dabei der Atherosklerose an den Körperarterien oder aber der essentiellen Hypertonie die größere Bedeutung zukommt läßt sich schwer sagen. Sehr häufig fanden sich eben beide Veränderungen zusammen und das Zahlenmaterial ist für eine getrennte Betrachtung doch noch nicht groß genug. Es hat aber doch den Anschein als ob die starke Atherosklerose der Körperarterien die größere Rolle spiele wie aus folgender Berechnung hervorgeht.

Unter den gesamten 170 Sektionsfällen älterer Frauen (von 50—89 Jahren) haben sich insgesamt 51 Fälle mit essentieller Hypertonie ausfindig machen lassen und unter diesen 15 Fälle mit Apoplexia uteri, während sie in den übrigen fehlte, das bedeutet 29,4 %. Dagegen waren unter den gleichen 170 Sektionsfällen 45 Fälle mit besonders schwerer und ausgedehnter Atherosklerose im Gesamtorganismus vorhanden und unter diesen 17 Fälle mit Apoplexia uteri, das heißt 37,7 %. Das wäre sogar beinahe das Doppelte der Durchschnittszahl unter allen Fällen überhaupt.

Andererseits darf aber doch nicht übersehen werden, daß auch ohne schwere Atherosklerose im Gesamtorganismus und ohne essentielle Hypertonie eine Apoplexia uteri nicht ganz selten vorkommt. Auf das Gesamtmaterial bezogen in 12,4 % und das beweist, daß beide Faktoren keine notwendige Vor-

aussetzung darstellen können, sondern eben nur begünstigend zu wirken scheinen.

Damit drängt sich ganz von selbst die Frage auf, ob nicht rein örtliche Verhältnisse im Uterus selbst das Wesentliche darstellen, insbesondere Veränderungen an den Uterinarterien.

Von etlichen Autoren (E. Fraenkel (3), von Kahlden (5), Kaufmann (6), Simmonds (13)) wird angegeben, daß die Uterinarterien eher und stärker an Atherosklerose erkranken als die sonstigen Körperarterien. Infolgedessen können auch diejenigen Fälle, die nur geringe atherosklerotische Veränderungen im Gesamtorganismus bei Apoplexia uteri aufweisen, doch damit erklärt werden, daß die Neigung zu Gefäßerkrankungen im Sinne der Atherosklerose bei ihnen zur Zeit des Todes schon vorhanden war, aber zuerst und nur im Gebiet der Uterinarterien in Erscheinung getreten ist, während eben die übrigen Gefäßbezirke noch fast völlig frei sind. Von den meisten Autoren (von Kahlden (5), Kaufmann (6), Kon und Karaki (7), Polano (10), Simmonds (13)) werden die bei Apoplexia uteri beschriebenen Gefäßveränderungen als in das Gebiet der Atherosklerose gehörig bezeichnet. Dieser Überprüfung dienten nun meine histologischen Untersuchungen an 14 Fällen der ersten Tabelle (I). Ich lasse die histologischen Untersuchungen hier folgen.

Makroskopischer und mikroskopischer Befund.

Fall I. 83jährige Frau (Sekt.-Nr. 30/32).

Der Uterus ist stark atrophisch. Es sind nur partielle Schleimhautblutungen im Corpusbereich vorhanden.

Mikrosk.: Stark atrophische Schleimhaut im Corpus- wie im Cervixbereich mit geringen Blutaustritten in den oberen Schichten der Cavumschleimhaut. Erweiterte atrophische Drüsenschläuche. Stroma faserreich. Gefäßwände stark verdickt und hyaliniert, teilweise verkalkt und zwar spangen- und ringförmig in der Media. Stellenweise starke Intimahyperplasie ohne Verfettung, auch die Arteriolen sind verdickt. Keine Thromben.

Im Cervixbereich der gleiche Befund, aber keine Schleimhautblutung, lediglich eine kleine Blutung im Myometrium bei starker Intimahyperplasie der hier vorhandenen Arterien. Nichts von Entzündung, keine Nekrosen.

Fall II. 69jährige Frau (Sekt.-Nr. 37/32).

Altersatrophischer Uterus mit dunkelamtroter Cavum-schleimhaut.

Mikrosk.: Nur noch einzelne Drüsen-schläuche in dem sehr faserreichen Stroma der Schleimhaut. Durchsetzung mit Haemorrhagien in mäßigem Grade, namentlich in den obersten Schichten der dünnen faserreichen Schleimhaut. Im Myometrium keine Blutungen. Gefäße nicht besonders dick und auch bei Elastikafärbung keine nennenswerte Intimahyperplasie. Dagegen an einzelnen Stellen in der Wandung mittlerer und größerer Gefäße Verdacht auf Media Nekrose, aber sicher hier und da etwas Mediaverkalkung.

Im Cervixbereich sehr dünne Schleimhaut, in welcher einzelne zum Teil noch mit Schleim gefüllte Ovula Nabothii liegen. Keine Blutung. Keine wesentlichen Gefäßveränderungen.

Fall III. 78jährige Frau (Sekt.-Nr. 87/32).

Der Uterus zeigt die Erscheinungen der Uterusapoplexie. Im Corpusbereich ist eine ausgedehnte Schleimhautblutung vorhanden.

Mikrosk.: Das Corpusgebiet weist cystisch erweiterte Drüsen-schläuche auf. Das Stroma ist oval bis spindelzellig. Im Stroma, sowie in den Drüsen-schläuchen frische Blutungen. Kein Haemosiderin. Ganz vereinzelt Blutungen am Übergang zum Myometrium, schon in diesem liegend. Übriges Myometrium frei von Blutungen. An Gefäßen keine besonders starke Intimahyperplasie, geringe Verfettung. Gefäße des Myometriums an mehreren Stellen mit Hyalinisierung der Media und vielleicht auch Nekrotisierung.

Im Cervixbereich einige Ovula Nabothii. Die Schleimhaut ist hier atrophisch. Es sind keine Blutungen auch nicht im Myometrium vorhanden. Gefäße mit gering verfetteter Intima. Nirgends etwas von Entzündung.

Fall IV. 75jährige Frau (Sekt.-Nr. 115/32).

Die Cavum-schleimhaut zeigt ausgedehnte flächenhafte Blutungen, die gegen den Cervixbereich hin abnehmen.

Mikrosk.: Im Corpusgebiet mikroskopisch sichere ziemlich ausgedehnte Blutung im Stroma der Schleimhaut. Die Schleimhaut ist schon ziemlich atrophisch. Die Drüsen-schläuche sind spär-

lich, das Stroma faserreich. In Myometrium und Drüsen[schläuchen kein Blut. Gefäße wandverdickt, besonders die Media, dabei Verfettung von Intima. Stellenweise viel spangen- bis ringförmige Kalkeinlagerungen in der Media, keine Medianekrose. Verkalkung der Elastika interna.

In der Cervixgegend sind die noch vorhandenen Drüsen[schläuche stark cystisch erweitert. Keine Blutungen, Gefäße hier in der Media verfettet.

Fall V. 64jährige Frau (Sekt.-Nr. 119/32).

Die Cavum[schleimhaut zeigt mäßig starke fleckenhafte Blutungen.

Mikrosk.: Ausgedehnte Blutung in atrophischer Fundus[schleimhaut, Myometrium frei von Blutung. Die Gefäße zeigen mäßige Intimahyperplasie, ohne Verfettung. Stellenweise aber fleckförmige Mediahyalinisierung mit Verkalkung.

Im Cervixbereich eine Blutung im Myometrium. Die Gefäße entsprechen hier dem Corpusbereich.

Fall VI. 64jährige Frau (Sekt.-Nr. 178/32).

Die Cavum[schleimhaut ist im Corpusgebiet blutig durchsetzt. Auf dem Schnitt durch die Uteruswandung ragen mehrere Gefäßstümpfe klaffend hervor.

Mikroskop.: Sichere Blutung im Stroma der atrophischen Corpus[schleimhaut. Gefäße des Myometriums nur prall hyperämisch, nirgends Blutungen. Sehr deutliche stellenweise sogar ausgedehnte Hyalinisierungen in der Media. Gefäße dabei nicht besonders verdickt und keine wesentliche Verfettung.

Im Cervixbereich sind die Drüsen[schläuche nur wenig erweitert. Nichts von Blut, im Stroma und in den Drüsen[schläuchen, nur im Myometrium. Bei Elastikafärbung keine wesentliche Intimahyperplasie, keine Verfettung.

Fall VII. 67jährige Frau (Sekt.-Nr. 267/32).

Makroskopisch ausgedehnte Blutung im Corpusgebiet des Uterus.

Mikrosk.: Blutung in drüsen[schlaucharmer faserreicher Corpus[schleimhaut. Kein Blut im Myometrium. Geringe Verfettung der Intima mit etwas Hyperplasie. Keine Mediaveränderungen.

In der Cervixschleimhaut Ovula Nabothii. Kein Blut in den Drüsen-schläuchen und im Myometrium. Die Gefäße sind in demselben Grade verändert wie im Corpus.

Fall VIII. 77 jährige Frau (Sekt.-Nr. 286/32).

Makroskopisch ist die Corpus-schleimhaut blutig durchsetzt. Auf dem Schnitt sieht man eine Anzahl starre, klaffende Gefäße.

Mikrosk.: Diffuse Blutung in der atrophischen Schleimhaut, vornehmlich in der allerobersten Schicht. Kein Blut in den Drüsen-schläuchen aber hier an der Grenze von Schleimhaut und Myometrium einzelne Blutungen. Die Gefäße zeigen Mediahyalinisierungen, außerdem stellenweise ziemlich starke Verfettung der Media und auch Verkalkungen. Gleichzeitig besteht an mehreren Gefäßen eine Intimahyperplasie.

Im Cervixbereich keine Blutungen. Die Gefäßveränderungen sind in gleicher Stärke wie im Fundusbereich vorhanden.

Fall IX. 64 jährige Frau (auswärtige Sekt. v. 13. 10. 32).

Makroskopisch sind die Erscheinungen der Uterusapoplexie vorhanden.

Mikroskop.: Mäßig starke Blutung in den oberen Schichten der Corpus-schleimhaut. Die kleinen Gefäße sind hyperämisch. Die mittleren und größeren Gefäße zeigen deutliche Media-verkalkung.

Im Cervixbereich keine Blutung. Hier sind die Gefäße auch nicht wesentlich verändert, nur einzelne davon sind in der Media verkalkt.

Fall X. 89 jährige Frau (Sekt.-Nr. 23/33).

Wenig ausgedehnte Blutung in der Schleimhaut des Uterus-cavums.

Mikrosk.: Spärliche Drüsen-schläuche im Fundus, teilweise cystisch erweitert. Das Stroma ist faserreich. Stark hyperämische Gefäße, die überwiegen, aber auch kleinere Blutungen in den oberflächlichen Schleimhautschichten. Die größeren Gefäße sind verkalkt.

In der Cervix viele prall gefüllte Gefäße. Die Drüsen-schläuche sind größtenteils cystisch erweitert. Die Media der Gefäßwände ist verkalkt, leicht verfettet, in Cervix und Corpus das gleiche Bild.

Fall XI. 70 jährige Frau (Sekt.-Nr. 141/35, N).

Ausgedehnte Schleimhautblutung im Corpusgebiet.

Mikrosk.: Starke diffuse Blutung in der ganzen atrophischen Schleimhaut, wie auch fleckförmig im Myometrium. Die Gefäße zeigen Intimahyperplasie. Die Media ist verfettet und verkalkt.

In der Cervixgegend weniger starke Veränderung der Gefäße, keine Blutung. Ovula Nabothii.

Fall XII. 73 jährige Frau (Sekt.-Nr. 249/33).

Makroskopisch sichere Schleimhautblutung im Uteruscavum.

Mikrosk.: Diffuse Blutung in den oberen Schleimhautschichten bei stark gefüllten hyperämischen Kapillaren. Die Drüsenschläuche sind frei von Blutungen. Einzelne kleinere Blutaustritte sind im Myometrium ebenfalls bei prall gefüllten Gefäßen vorhanden. Die Gefäßwände zeigen Mediahyalinisierung und ganz geringe Verkalkung an einzelnen Stellen, kein Fett. Geringe Intimahyperplasie. Im Cervixbereich zeigen die Gefäße stärkere Verkalkung als im Fundusbereich.

Fall XIII. 81 jährige Frau (Sekt.-Nr. 326/34).

Geringe fleckförmige Blutung im Cavum des Uterus. Auf dem Schnitt durch den Uterusfundus sind mehrere atherosklerotisch veränderte Gefäßstümpfe zu sehen.

Mikrosk.: Kleine punktförmige Blutaustritte in der Schleimhaut. Verkalkung der Media. Keine Verfettung der Gefäße. In der Cervix finden sich namentlich hyperaemische Gefäße. Die Gefäßveränderungen der mittleren und größeren Gefäße gleichen hier denen im Corpusbereich.

Fall XIV. 63 jährige Frau (Sekt.-Nr. 362/34).

An der Portio ist ein kleiner linsengroßer Polyp vorhanden und im Corpus uteri ein bleistiftdicker 2 cm langer Polyp, der seinen Stiel in der Cervix hat. In der Cervix finden sich einige Ovula Nabothii. Das Cavum uteri ist von einer flächehaften Blutung durchsetzt.

Mikrosk.: Mäßig starke Blutung in der Corpus[schleimhaut. Die Schleimhaut ist spärlich. Das Myometrium ist frei von Blutungen, lediglich Hyperaemie vorhanden. Gefäße zeigen Intimahyperplasie und geringe Verfettung in der Media. Cervix o.B.

Tabelle III.

Übersicht über den örtlichen Befund im Uterus.

Lfd. Nr.	Sekt.-Nr.	Alter Jahre	Blutungen			Häemosid.	etw. Entzündungen	Blutungen im Myometrium	Gefäßveränderungen
			im Endometrium	im Stroma	i. d. Drüsenlchl.				
1	3 32	83	+	+	+	—	—	+	An Arterien starke Verdickungen, Hyalinisierungen, und Kalkablagerung. Arteriolen verdickt.
2	37 32	69	+	+	—	—	—	—	Nur geringe Intimahyperplasie, stellenweise Mediaverkalkung.
3	87 32	78	+	+	+	—	—	(+)	Geringe Intimahyperplasie. Stellenweise vielleicht Medianekrose.
4	115 32	75	+	+	—	—	—	—	Arteriosklerose Verfettung u. Verkalkung d. Media.
5	119 32	64	+	+	—	—	—	+	Mäßige Intimahyperplasie. Fleckförmige Hyalinisierung u. Verkalkung in der Media.
6	178 32	64	+	+	—	—	—	+	Geringe Intimaverf. u. Hyperplasie. Deutliche Mediahyalinisierung, ohne Verfettung.
7	267 32	67	+	+	—	—	—	—	Geringe Intimaverfettung mit geringer Hyperplasie.
8	286 32	77	+	+	—	—	—	(+)	Arteriosklerose, Hyalinisierung und Verkalkung der Media.
9	auw. Sekt. 13. 10. 34 N.	84	+	+	—	—	—	—	Deutliche Mediaverkalkung.
10	23 33	89	+	+	—	—	—	—	Arteriosklerose und deutliche Mediaverkalkung.
11	141 33	70	+	+	—	—	—	+	Mediaverfettung u. Verkalkung, Intimahyperplasie.
12	249 33	73	+	+	—	—	—	+	Mediahyalinisierung u. Verkalkung, geringe Intimahyperplasie.
13	326 34	81	+	+	—	—	—	—	Starke Gefäßwandverkalkung.
14	362 34	63	+	+	—	—	—	—	Geringe Intimahyperplasie und Intimaverfettung.

Als Schlußfolgerung läßt sich über die histologisch untersuchten Fälle folgendes feststellen:

1. in Anbetracht des durchweg postklimakterischen Alters ist eine differenzialdiagnostisch sonst noch in Betracht kommende Menstruationsblutung schon von vorneherein ausgeschlossen. Aber auch histologisch konnten menstruelle Schleimhautveränderungen nicht gefunden werden. Meist war die Schleimhaut schon senil atrophisch, faserreich und enthielt vielfach erweiterte Drüsen-schläuche.

2. der Lokalisation nach waren die Blutungen nur auf die Corpus-schleimhaut beschränkt. In der Schleimhaut der Cervix waren in der Regel nie derartige Blutungen zu beobachten. Nur in hochgradigen Fällen, wenn die Blutung auch das Myometrium mitbetraf, konnten sie in dem der Cervix ebenfalls festgestellt werden. 5 mal beteiligte sich das Myometrium an den Haemorrhagien (Fall Nr. 1, 5, 6, 11, 12), in zwei anderen Fällen (Fall Nr. 3 und 8) nur andeutungsweise.

3. die Blutung war immer im Stroma der Schleimhaut lokalisiert, nur einmal gleichzeitig auch in den Drüsen-schläuchen (Fall Nr. 3).

4. wenn überhaupt eine Blutung im Sinne der Apoplexia uteri vorhanden war, dann wurden auch immer arterielle Gefäßwandveränderungen beobachtet. Dabei handelt es sich meist um mehr oder weniger starke Mediaveränderungen im Sinne einer Hyalinisierung, Verfettung und oft besonders deutlich einer Verkalkung. Medianekrosen waren gelegentlich vielleicht auch mit vorhanden, aber nicht sicher. Es besteht offenbar auch bei den Uterusgefäßen eine Bevorzugung der Mediaveränderungen, wie an den Extremitätengefäßen. Die Intimaveränderungen traten im allgemeinen dahinter zurück.

5. Haemosiderinablagerungen und etwaige Entzündungen konnten in keinem der Fälle festgestellt werden.

Stellt man nun aus der Tabelle III letzten Endes noch diejenigen Fälle zusammen, bei denen auf Grund des mikroskopischen Befundes eine starke Atherosklerose im Uterus festgestellt wurde, so kann man das von den untersuchten 14 Fällen in 6 Fällen (Fall Nr. 4, 9, 10, 11, 12, 13) behaupten. Ein weiterer Vergleich dieser starken Atherosklerose in den Uterusgefäßen

und derjenigen im Gesamtorganismus führt zu dem Ergebnis, daß dieselbe in allen 6 Fällen übereinstimmt (Fall Nr. 4, 9, 10, 11, 12, 13). Die starke Gefäßsklerose ist hier also im Gefäßsystem des übrigen Körpers und in dem des Uterus ungefähr parallel gelaufen. Andererseits wird aber nach den Angaben in der Literatur den Uterusgefäßen ein gewisser Grad von Selbständigkeit gegenüber den anderen Gefäßsystemen des Körpers zugesprochen (v. Kahlden 5, Kon und Karaki 7). Es ist deshalb nicht verwunderlich, wenn sich das auch an Hand unseres Materials bestätigt. Bei den restlichen 4 Fällen (Fall Nr. 1, 2, 3, 5) ist wohl an den Gefäßen des übrigen Körpers eine starke Atherosklerose vorhanden, aber auf Grund der histologischen Untersuchungen nicht im gleichen Maße an den Gefäßen des Uterus.

Bezugnehmend auf die histologischen Untersuchungen, soweit sie in der Literatur angegeben sind, ist zu sagen, daß die gleichen Gefäßveränderungen im Sinne der Atherosklerose (Simmonds 13, Kaufmann 6, v. Kahlden 5) auch bei den vorliegenden Untersuchungen gefunden wurden. Die von Fraenkel 13 und Bukojemsky 1 (in einem der Fälle) angegebenen Medianekrosen sind bei unseren Fällen nicht sicher festzustellen. Eher handelt es sich um eine Mediahyalinisierung, wie sie auch Simmonds 13 bei seinen Untersuchungen gefunden hat.

Zusammenfassung:

In vorstehender Arbeit wird an Hand von 34 Fällen von makroskopisch sicherer Apoplexia uteri aus dem Sektionsmaterial des Erlanger Pathologischen Instituts der Versuch gemacht der noch unklaren Genese dieses Leidens nicht nur durch histologische Untersuchungen an der betreffenden Gebärmutter selbst näher zu kommen, sondern vor allem durch eine Prüfung auf etwaige Zusammenhänge mit gestörten Kreislaufverhältnissen des Gesamtorganismus.

Diese 34 Fälle betreffen sämtlich Frauen im postklimakterischen Lebensalter von 51 bis zu 89 Jahren. Sie verteilen sich auf insgesamt 170 Frauen von 50 Jahren an aufwärts, so daß eine durchschnittliche Häufigkeit von 20 % errechnet werden konnte.

Bei getrennter Betrachtung derjenigen Fälle des Gesamtmaterials, bei denen entweder eine essentielle Hypertonie oder eine starke und ausgedehnte Atherosklerose an den Gefäßen des Gesamtorganismus oder beides zusammen vorlag, stieg die Zahl, der darin enthaltenen Fälle von Apoplexia uteri auf 32,3 % an, während sie für die übrigen Fälle, bei denen also die beiden genannten Kreislaufveränderungen fehlten auf 12,4 % absank.

Unter den 34 Fällen von Apoplexia uteri wiesen 21 Fälle = 61,8 % eine essentielle Hypertonie oder eine starke Atherosklerose an den Körperarterien oder sogar beides auf. 11 dieser Fälle gleich 32,3 % waren bei gleichzeitigem Vorhandensein von essentieller Hypertonie und schwerer Atherosklerose aufgetreten. Nur in 13 Fällen = 38,2 % fehlten beide Kreislaufveränderungen. Diese Zahlen sprechen für begünstigende Mitbeteiligung einer essentiellen Hypertonie und einer schweren Körperatherosklerose für das Zustandekommen der sog. Apoplexia uteri.

An den Arterien des Uterus selbst konnten bei allen Fällen von Apoplexia uteri mehr oder weniger deutliche Veränderungen gefunden werden und zwar neben atherosklerotischen Veränderungen meist stärker hervortretende Mediahyalinisierungen und Mediaverkalkungen. Die Schwere dieser Veränderungen ging vielfach der allgemeinen Atherosklerose im Gesamtorganismus einigermaßen parallel, blieb aber hin und wieder auch dahinter zurück.

Die Blutung war stets in das Stroma der atrophischen Uterusschleimhaut hinein erfolgt, nur ganz vereinzelt auch in ihre Drüsenschläuche und mehrfach waren auch noch kleine Blutungen im Myometrium mitvorhanden. Haemosiderinablagerungen als Reste früherer Blutungen und gleichzeitige Entzündungserscheinungen konnten in den untersuchten Fällen nicht beobachtet werden.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, dem Direktor des Pathologischen Instituts, Herrn Prof. Dr. E. Kirch auch an dieser Stelle meinen aufrichtigen Dank auszusprechen für die lebenswürdige Unterstützung bei der Ausführung meiner Arbeit und für die gütige Überlassung des Materials.

Gleichzeitig möchte ich nicht veräumen, Herrn Dr. H. Kunstmann für seine wertvollen Ratschläge bestens zu danken.

Schrifttum.

- 1) Bukojemsky, F. W., Die Gebärmutter[s]klero[s]e (Arterio[s]klero[s]is uteri) und deren Zusammenhang mit den Uterusblutungen.
Arch. Gyn. 99, H. 3 (1913).
- 2) Cruveilhier, Anatom. pathol. Livre 24.
- 3) Fraenkel, E., Über den Uterus senilis, insbesondere das Verhalten in den Arterien in demselben. Arch. Gyn. 83, 640 (1907).
- 4) Hueck, W., Anatomisches zur Frage nach Wesen und Ursache der Arterio[s]klero[s]e. Münchner med. Wochenschrift Nr. 19 (1920).
- 5) von Kahliden, Über die sogenannte Apoplexia uteri. Zieglers Beiträge Path. 23, 161, H. 1 (1898).
- 6) Kaufmann, Ed., Lehrbuch, Bd. II, S. 1268, (1922).
- 7) Kon und Karaki, Über das Verhalten der Blutgefäße in der Uteruswand. Virch. Arch. 191, (1908).
- 8) Meyer, Rob., Henke-Lubarsch, Handbuch der [spez. Pathologischen Anatomie und Histologie VII/1, S. 106, (1930).
- 9) Pankow, Die Ursachen der Uterusblutungen. Münch. med. Wochenschrift Nr. 52 (1909).
- 10) Polano, Über die sogenannte Apoplexia uteri. Verh. dt[s]ch. Gef. Gyn. Innsbruck 1922, 185. Zentralblatt Gynäk. 1922, Nr. 29, 1176.
- 11) Reinicke, E. A., Die Sklero[s]e der Uterinarterien und die klimakterischen Blutungen. Arch. Gyn. Bd. 53, 340, H. 2 (1897).
- 12) Rokitansky, Lehrbuch der Pathologischen Anatomie Bd. III, S. 469 (1861).
- 13) Simmonds, M., Über Blutungen des Endometriums bei Sklero[s]e der Uterinarterien. Münchn. med. Wochenschrift H. 2. 52 (1900).
- 14) Solovij, Die Sklero[s]e der Arterien der Gebärmutter als Ursache von unstillbaren Blutungen. Monatschrift f. Geburtshilfe und Gynäk. Bd. 25, H. 3.

Lebenslauf.

Ich, Friedrich Ehrentreich bin am 14. September 1907 zu Weidelbach geboren. Nach Besuch der dortigen Volksschule und der sechsklassigen Realschule in Dinkelsbühl siedelte ich nach nahezu 2 jähriger Unterbrechung auf die Oberrealschule nach Schwäbisch Hall über, wo ich im Jahre 1928 die Reifeprüfung ablegte. Meinen naturwissenschaftlichen Neigungen zufolge wählte ich das Studium der Medizin und der Zahnheilkunde und nahm es im Mai 1928 an der Universität Erlangen auf. Dasselbst bestand ich im Sommersemester 1930 die ärztliche und zahnärztliche Vorprüfung. In den folgenden Semestern studierte ich in München und Würzburg, worauf ich wieder nach Erlangen zurückkehrte und im Herbst 1933 die ärztliche Prüfung ablegte. Während meines praktischen Jahres war ich neun Monate an der inneren Abteilung des Rudolf-Heß-Krankenhauses in Dresden tätig und den Rest am Pathologischen Institut der Universität Erlangen.
